



pars makian

پارس ماکیان
Parsmakian.com
[09014542876](tel:09014542876)

✓ راهنمای جامع مراقبت از جوجه یک روزه گوشتی و محلی پس از تحویل

■ بخش اول: آماده‌سازی اصولی محل نگهداری

✓ دمای سالن باید حداقل ۱۲ ساعت قبل از ورود جوجه‌ها به ۳۲ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد برسد. کاهش دما باید تدریجی باشد و بر اساس رفتار جوجه‌ها تنظیم شود.

✓ از پوشال نرم و خشک با ضخامت ۵ تا ۷ سانتی‌متر استفاده شود. پوشال مرطوب عامل اصلی رشد قارچ‌ها و باکتری‌هاست.

✓ گرمایش سالن با مادر مصنوعی یا هیتر گازی استاندارد انجام شود. هر منبع گرمایی باید محافظ ایمنی داشته باشد.

✓ تهویه مناسب بدون جریان مستقیم باد حیاتی است. مقدار گاز آمونیاک باید همیشه زیر ۱۰ ppm باقی بماند.

✓ نوردهی شبانه‌روزی با شدت ۳۰ تا ۴۰ لوکس در سه روز اول توصیه می‌شود. از هفته دوم می‌توان روشنایی را به تدریج کاهش داد.

بخش دوم: آب دهی و تغذیه استاندارد

- ✓ آب ولرم (۳۰ تا ۳۵ درجه) بلافاصله بعد از ورود جوجه‌ها فراهم شود تا از شوک سرمایی جلوگیری شود.
- ✓ مصرف الکترولیت، گلوکز و مولتی‌ویتامین مخصوص طیور در ۴۸ ساعت اول باعث تقویت ایمنی و جلوگیری از دهیدراته شدن می‌شود.
- ✓ خوراک باید استارتر مخصوص نژاد گوشتی با دانه‌بندی گرانول یا کرامبل باشد. دان پودری ممکن است منجر به انسداد چینه‌دان شود.
- ✓ به ازای هر ۵۰ جوجه یک آب‌خوری و یک دان‌خوری در نظر گرفته شود. در روزهای اول از دان‌خوری سینی‌ای هم استفاده شود.
- ✓ تعویض روزانه آب و شستشوی آب‌خوری‌ها الزامی است. آب آلوده یکی از عوامل اصلی بیماری‌های گوارشی است.

بخش سوم: تراکم، رفتار طبیعی و پایش رشد

- ✓ تراکم استاندارد در هفته اول بین ۲۰ تا ۲۵ قطعه در هر متر مربع است. با رشد جوجه‌ها، تراکم باید کاهش یابد.
- ✓ رفتار طبیعی جوجه‌ها شامل تحرک مناسب، پراکندگی یکنواخت و صدای آرام است. تجمع غیرعادی زیر منبع گرما نشانه سرما و جمع شدن در گوشه‌ها نشانه تهویه نامناسب یا استرس است.
- ✓ وزن‌گیری دوره‌ای در روزهای ۷، ۱۴ و ۲۱ انجام شود. نتایج با منحنی رشد نژاد راس مقایسه گردد.
- ✓ استفاده از ترازوی دقیق و ثبت اطلاعات روزانه در دفترچه پرورش، به تصمیم‌گیری درست در مدیریت گله کمک می‌کند.

بخش چهارم: پیشگیری از بیماری‌ها و اقدامات بهداشتی

- ✓ پیش از ورود جوجه‌ها، ضدعفونی کامل سالن، کف و تجهیزات با مواد استاندارد مانند ید یا آمونیوم چهارظرفیتی انجام شود.
- ✓ برنامه واکسیناسیون پایه شامل موارد زیر است:
 - روز ۳: نیوکاسل HB1 به صورت قطره چشمی
 - روز ۱۴: گامبورو آشامیدنی
 - روز ۲۱: نیوکاسل لاسونا اسپری
- ✓ در مناطق پرخطر، واکسن آنفلوآنزا در روز ۴۲ به صورت تزریق عضلانی انجام شود.
- ✓ ورود افراد متفرقه به سالن ممنوع است. استفاده از لباس، چکمه و حوضچه ضدعفونی ضروری است.
- ✓ ضدعفونی هفتگی آب‌خوری‌ها با پرمنگنات یا مواد غیراسیدی توصیه می‌شود.

■ یادآوری مهم از پارس ماکیان

تمام جوجه‌های تحویلی پارس ماکیان حاصل از تخم‌های نطفه‌دار با تضمین حداقل ۸۰٪ نطفه‌داری هستند. رعایت اصول مدیریت در هفته اول، مستقیماً روی کاهش تلفات و افزایش راندمان اثرگذار است.

■ پشتیبانی تخصصی

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، با شماره

۰۹۰۱۴۵۴۳۸۷۴ تماس بگیرید.

تیم فنی پارس ماکیان همراه شما در تمام مراحل پرورش است.

مکجان